

稼

圃

輯

稼園輯

秋水

稻品

箭子秈

紅蓮

六十日秈

百日赤

拖犁歸

厨種

占城稻

金城稻

勝紅蓮

擺極稻

雪裡棟

師姑抗

矮白

早白稻

蘆花白

麥爭場

烏口稻

冷水結

再熟稻

中秋稻

早中秋

亦名西風

紫芒稻

下馬丹

三朝齊

香抗

香子

亦名香稻

三穗千

已上抗

六月

烏

此種五月尚可浸撒

金鼓糯

羊八糯

胭脂糯

亦名硃砂糯

虎皮糯

矮兒糯

稗陳糯亦名雀不覺

青稗糯

蘆黃糯亦名泥裡變

秋風糯亦名瑞官糯冷粒糯帶道糯

小娘糯

烏香糯

鐵梗糯

馬鬃糯

半干糯

麥品

小麥忌戌大麥忌子日種又忌十二月丁日

大麥

小麥

莠麥

禹麥

宜庚午辛未辛巳庚戌庚子辛卯又八月三卯日

豇品

小豆忌卯大豆忌申日種總忌六月戌日

菜豇

豌豆音寒

蠶豇

赤豇

紅豇

角豇

梅豇

黃豇

刀豇

藕豇

宜甲子乙丑壬申丙子戊寅壬午壬寅六月三卯日

芋品

百子芋

佛士芋

南京芋

君子芋

車穀芋

鋸子芋 安巨芋 青邊芋 紫芋 談芋 鷄子芋

蔓芋 禾芋 旱芋 買芋 九面芋 象空芋

青芋 素芋 連禪芋 白芋

麻品附 丑正月卯日又己亥戊申壬申甲申辛亥庚申

胡麻 芝麻 黃麻 苧麻 絡麻 棉花 靛 藍

栽種吉日名鼠雀不食日 癸酉忌寅未日種

己未甲午癸亥○凡種五穀宜成收滿平定日 癸巳丁亥日

浸穀吉日 雪水糞三滾候冷浸之不生蟲

甲戌乙亥壬午乙酉壬辰乙卯戌開日

撒秧吉日

辛未癸酉壬午甲午甲辰乙巳丙午丁未戊申巳酉乙卯  
辛酉戌戌日忌丙日秋忌寅未泰忌丑

下種吉日名百蟲不食日

乙丑乙亥乙未己亥壬寅癸卯壬子忌天火地火九焦  
月殺建破

栽禾吉日

甲子乙丑丁卯己巳癸酉乙亥丙子己卯庚辰癸未甲申  
乙酉己巳辛卯癸巳乙未丙申戊戌己亥庚子辛丑壬寅  
癸卯丙午戊申己酉癸丑戊午己未庚申辛酉癸亥

庚午壬申癸酉己卯辛巳壬午癸未甲午癸卯甲辰乙酉  
收開日忌役日丙日忌田痕日

種麥庚午辛未辛巳庚戌庚子辛卯八月三卯

種麻四月三卯 種豈六月三卯

四耗日春壬子夏乙卯秋戌午冬辛酉

造倉種作虛耗散  
收割入倉盡消空

百蟲食日正丑二子三亥四戌五酉六申七未八年九巳

十辰十一卯十二寅 百蟲所害種子空

地蟲食日正巳二辰三卯四寅五丑六子七亥八戌九酉

十申十一未十二午 地蟲食子下種子落土三日盡皆空

天火日正五九子二六十卯三七十一午四八十二酉  
地火日正巳二午三未四申五酉六戌七亥八子九丑十

寅十一卯十二辰

壠田吉日用火日如丙寅丁卯甲戌乙亥之類忌日癸己

甲午乙酉辛丑壬寅己酉庚戌丁巳戊午

月殺忌栽種正丑二戌三未四辰五丑六戌七未八辰九  
丑十戌十一未十二辰

月建 正寅二卯三辰四巳五午六未七申八酉九戌十  
亥十一子十二丑

月破 正申二酉三成四亥五子六丑七寅八卯九辰十

巳十一十二未

八月十三至廿二凡十日爲曆家天忌種樹凡栽種皆忌  
九焦日正辰二丑三成四未五卯六子七酉八午九寅十

亥十一申十二巳 下種插荷俱忌

蟄變忌日年月孰破二辰是大耗小耗皆凶

蟄坐向忌方年月孰破二方

蟄變吉日 九月甲子丙寅庚午辛未壬申丙子辛巳癸

未甲申癸巳甲午丙申己亥庚子丙午戊申丁巳己未



庚申壬戌癸亥 十月甲子乙丑丁卯庚午壬申癸酉丙子丁丑  
己卯壬午癸未甲申戊子己丑辛卯乙未戊戌己亥庚子癸卯丙  
午壬子甲寅己卯己未庚申壬戌 十一月甲子乙丑丁卯壬申  
癸酉甲戌丙子己卯甲申己丑丁酉壬寅癸卯甲辰戊申癸丑甲寅  
辛酉壬戌

飛蟲不食吉日 初一初四初五初七初九初十十八廿二廿九 宜種  
五穀

逐月種植吉日 正月丁卯己卯辛卯癸酉丁酉乙亥癸卯己卯辛酉

癸亥丙寅戊寅 二月甲子丙子庚子壬子戊子 三月丁卯己巳

丁丑己卯辛巳己丑辛卯辛丑癸卯癸丑丁巳 四月甲子丙寅丁

卯庚午丙子戊寅己卯壬子壬午庚寅辛卯甲午庚子壬寅癸卯丙  
午 五月戊辰辛未庚辰辛巳甲辰丙辰 六月丙寅戊寅庚  
辰庚寅壬寅甲辰外甲申丙申庚申 七月丁卯己卯辛卯乙巳  
辛巳癸巳癸卯 八月甲戌庚戌壬戌 九月辛未癸未己未  
己亥癸亥己酉 十月甲子丙子戊子壬子庚子庚午癸酉  
甲午丁酉丙午己酉戊午辛酉 十一月癸酉甲戌丁丑己丑辛  
丑己酉庚戌癸丑辛酉壬戌 十二月壬申甲戌甲申丙申戊  
戌戌申庚戌庚申壬戌

逐月收割吉日 正月庚午壬午甲午己卯癸卯癸酉己酉

二月辛巳巳巳癸巳乙巳丁巳癸未甲戌丙戌戊戌壬戌丁亥巳  
亥癸亥 三月巳卯癸卯甲辰 四月巳卯癸卯甲辰庚午壬午  
甲午 五月甲辰辛巳庚午甲午癸未壬申 六月癸未巳酉  
癸酉 七月巳卯癸卯甲辰壬申癸酉巳酉 八月甲辰辛巳  
壬申 九月庚午壬午甲午癸酉巳酉 十月壬午甲午癸酉  
巳酉 十一月癸未 十二月巳卯癸卯 外有吉日不書  
田夫死莖忌種五穀 甲寅丁亥丁未丙戌乙巳辛亥癸巳 耕  
作開田耕耘供忌

天地不收成日 丙戌乙未壬辰辛亥

田火日 正戌二亥三子四丑五寅六卯七辰八巳九午十未十一申十二酉

田痕日 大月初六初八廿二廿三 小月初八十一十三十七十九

試新宜尾平定戌收開閉日忌建除滿執破日凶 正月癸酉丁酉

二月丁亥 三月丙子庚子丁卯巳卯辛卯癸卯 四月乙丑辛

卯巳卯癸卯 五月丙辰辛巳甲辰戊辰庚辰壬辰 六月辛卯

癸卯巳卯 七月巳卯癸卯丙辰 八月巳巳乙巳 九月庚午壬午

丙午 十月戊午 十一月無 十二月庚申外壬申丙申戊申

穀有九種黍稷秬稻麻大豈大麥小豈小麥凡種沍澇則不生  
生亦尋死種雜則早晚不均春復戒而夏難熟收稻時宜揀選  
好穗純色者晒乾草包高懸以防鼠耗將種前廿日取出晒之  
牽馬就穀堆食數日以馬踐過為種無蟲蝨等蟲也種傷溼則  
生蟲用漂蠶繭水或臘雪煮三沸候冷漬之雪汁者五穀  
之精使稼又耐旱也

稻花白而瓣少則米賤瓣多而色黃則米貴故云銀花賤  
金花貴也

凡五穀上旬種者全收中句中收下句下收地勢有良薄

山澤有異宜良田宜種晚薄田宜種早良田非獨宜晚早亦無害薄田必不宜種晚種晚必少收崔寔曰美田欲稀薄田欲稠

開高荒田燒去野草犂過先種芝麻一年則草根敗爛芝麻之於草猶鉛之於五金性相制也開低荒田冬間墾轉三四次草根可凍死○春耕宜遲秋耕宜早遲者以春凍漸解地氣始通早者乘天氣未寒將陽和之氣掩在地中也二月三月早晚可耕夏則夜始平和秋宜日高耕若冬則掩寒氣在令地薄不收子粒秋田殘年開墾待水

凍過則土脉春來易平。又不生草。平後晒乾。入水澄清。方可撒種。

壟田麻餅豈餅。每畝可三十斤。和灰糞或綿花餅。每畝下二百斤。插秧前一日。將綿花餅化開。勻攤田內。抄轉然後插秧。○浸種早稻。清明前。晚稻穀雨前。晝浸夜收。穀芽易長。撒時清明。則芽易豎。芽長一分。拌鬆方撒。撒後二三日。撒稻柴灰於上。則易生根。隨以糞潑之。

插秧在小滿後。芒種前爲上時。拔秧洗去宿泥。揀去稗草。六莖爲一叢。六叢爲一行。稈行宜直。以便耘耨。淺插則易。

發稻屬陰故宜水澤。○稻初發用耨耨於耨行中耨去稗  
草則易耘、搜鬆稻根則易旺、耨斷橫根則頂根直生向下。  
○耨稻後將下壟撒入田內、耨去草淨近秋放水、將泥塗  
光稻根謂之稿。音各稻待土迸裂上水浸之、謂之還水直至  
成熟方可歇水。○寧可蔣餒秧、莫要蔣餒田。餒田者、隔夜攤  
者是也。

凡五穀種同而得時者穀多、穀同而得時者米多、米同而  
得時者飯多、飯同而得時者久飽而益人。

種稻每年換種、如今年種杭、明年此田當種糯、不可年年  
種一色、即欲原種粳、而粳之種宜換原種糯、而糯種宜換



蔣秧忌九焦日辰日

凡糞用火焚熟則耐旱考周禮疏亦具載其事糞糞令熟  
墾田其利百倍每糞入各骨同焚中糞用牛骨之類若人  
糞以頭髮少許代之將鴛腸草黃蒿蒼耳草三味燒灰同  
拌熟糞肥土晒乾撒蓋種上。糞既經焚皆成清汁樹雖  
將枯灌之立活至佳。晒乾馬糞墾田則穀盛。用糞至  
火日忌金水二日。用糞於未種之先謂之墊底店什也用於既  
種之後謂之接力墊底之糞在土下根得之而愈深接力  
之糞在土上根見之而反上故善稼者皆在耕時用糞種

後不使下也。大都用糞者，要使化土，不徒滋苗，化土則用糞於先，而使瘠者以肥。滋苗則用糞於後，徒使苗枝暢茂，而實不繁。用糞宜斟酌，若驟用生糞，及布糞過多，糞力峻熱，反爲害矣。故農家有糞藥之喻，謂用糞如用藥，寒溫通塞，不可悞也。○四月初四稻生，日喜晴。

汜勝之曰：三月種秔，四月種秈。○白露白遲，秋分稻秀齊。

稻名白秈，曰赤秈，曰秈穠，曰烏稜。○寒露無青稻，霜降一齊倒。

秈之熟也早，故曰早稻；稔之熟也晚，故曰晚稻。○京口大

稻曰粳，小稻曰秈。其粒細長而白，味甘而香，九月而熟，是

稻之上品曰箭子秈

粒大而芒紅皮赤五月而種九月而熟曰紅蓮

粒小而色白四月而種六月而熟謂之六十日秈又遲者謂之八十日秈又遲者曰百日赤耐水旱而作飯差硬

太平府六十日秈曰拖犂歸有赤紅秈百日秈白秈而無芒或七月或八月而熟其味白淡而紅甘○閩則無芒而粒細有六十日可獲者有百日可獲者曰占城稻

八廚種出陳墓周庄其粒大而有飯米價比他處頗高且有收耐水亦名狼籍八石

粒尖色紅而性硬四月而種七月而熟曰金城稻松江謂之赤米乃穀之下品

粒長而色斑。五月而種。九月而熟。松江謂之勝紅蓮。

性硬而皮莖俱白，謂之穞。音亞。穞音亞稻。

粒大色白釋軟而有芒謂之雪裡棗

粒白無芒而稈矮五月而種九月而熟謂之師姑秬四明  
名爲矮白

粒赤而稃芒白五月初而種八月而熟曰早白稻松江曰  
小白四明曰細白九月而熟曰晚白又曰蘆花白松江又曰大白

三月而種六月而熟曰麥爭場

想即瓜熟稻有種以祀先於七月望者

再種而晚熟曰烏口稻在松江邑黑而耐水與寒又謂之

冷生結是稻之下品

越即六月為其稻種每夏初移動一次即幾年可浸可撒若一年不移動便不可用矣

若遇水災或缺秧即六月尚可撒秧秋水退播可待但少收耳

已刈而根復發苗再實者曰再熟稻亦曰再檢亦曰稻孫

粒白而大四月而種八月而熟曰中秋稻松江八月望而

熟者曰早中秋又曰閃西風

粒白而殼紫五月而種九月而熟曰紫芒稻

秀最易者曰下馬者又曰三朝齊

松江粒小而性柔有紅芒白芒之等七月而熟曰香秔  
粒小色斑以三五十粒雜他米數升炊之芬香曰香子又  
曰香秔新是為上品有青幽白夏之名

在湖州一穗而三百餘粒者曰三穗禾

已上  
秔稻

糯米粒長而釀酒倍多者曰金釵糯

色白而性軟五月種十月熟曰羊脂糯

芒長而穀多白秔四月種九月熟曰膳脂糯太平謂之秣  
砂糯

色斑五月種十月熟曰虎皮糯太平錄云厚秔紅黑斑而

芒

粒最長、白稈而有芒、四月種、七月熟、曰稈陳糯、太平謂之  
雀不覺、亦謂之私糯、其性不黏、稈糯之下品、

粒大而色白、四月種、九月熟、曰矮糯、亦曰矮兒糯、

稈黃而芒赤、已熟而稈微青、布宜良田、四月種、九月熟、曰  
青稈糯、

粒大而色白、芒長而熟最晚、其色易變、其釀酒最佳、曰蘆  
黃糯、湖州謂之泥裡變、言其不待日之曬也、

粒員白而稈黃、大暑可刈、其色難變、不宜於釀酒、曰秋風

糯可以代秬輸租。又謂之暘官糯。松江謂之冷粒糯。亦名  
弗道糯。極下品。

其不耐風水。四月種。八月熟。曰小娘糯。譬之閨女然也。

湖州有邑烏而香者。曰烏香糯。其稈挺而不仆者。曰鐵梗  
糯。芒如馬鬃而邑赤者。曰馬鬃糯。

有穗盈尺。每穗穀五百粒。曰半千糯。

糯米妊娠與雜肉食之。子生寸白。病久食身軟。發風動氣。  
糯米利於六月小。諺云。六月大。莫種糯。八月小。糯米便是  
寶。想月小則少收。故貴。



麥經

麥之種也、土欲細溝欲淺、爬欲輕、撒欲勻、

麥最喜雪、諺云冬無雪、麥弗結。○麥花盡開、主水

刈麥必晴天、麥穗乾硬則可堆積、不爾、便出蛾而無用、

小麥黃熟、趁晴急收、諺云、收麥如救火、遲恐雨傷、

三月十一麥生日、喜晴、麥屬金、火旺則死、

小麥用糞沙水浸一宿、下種則耐寒、小麥忌戌日下種、

寒食雨爛麥堆、

四月初八忌雨、諺云小麥是個鬼、只怕四月初八日一

夜個雨 四月十三有雨麥無收

小麥弗過冬大麥弗過年

麥占四時秋種夏收北方多霜雪麴無毒南方少雪麴有毒  
種麥以灰糞蓋之諺云無灰不種麥灰糞均調爲上

麥澆菜菜澆花

冬天麥苗盛時使人縱放蹂踐令稍實其收倍多麥屬陽  
故喜乾怕水澤○四月中有沙霧能傷麥侵晨令雨人對  
持長索於麥上牽拽去其沙

小麥曰宿麥八月上戌社前爲上時中戌爲中時下戌爲  
下時俱以社前言禮記月令曰仲秋之月乃勸人種麥無

或失時、其有失時、刑罰無赦。○晚種則無收、晚則寒鴉食之而穢。○種麥至八月三日、經雨社、倍收而堅好。麥兩岐主太平、田至秋、必倍收、家必發。

當年杏子多、則大麥不結、桃子多、則小麥不結。

收得三伏內晒極乾、帶熟收、先以稻柴灰鋪缸底、方貯麥上、以灰蓋之、不蛀、用水蓼麻葉剉碎、或蒼耳子與葉雜麥中、不生蛾。○麪傷、白蘿蔔解之。○臘麥至六月、立秋後則

生蟲。○臘麥晒至未時、乘熟收。

俗言  
臘麥

高麥春二三月下種、夏末秋初熟、味如鷄豆、肉粒扁而黃。

高七八尺不開花而吐然宜食

大麥忌子日下種八月中戌社前為上時下戌前為中時

八月末九月初為下時。久食有氣云久食令人多力多力健行頭髮不白。麥

芽久食消腎。暑用則健胃寬中。大麥蒸熟晒乾食之大

有益炒則無益。

菽麥立秋前後種。立秋在六月宜秋後十日。立秋在七月

宜秋前十日。冬收苗出即鋤稀稠得所澆以大糞苗長再

鋤草淨則茂稠則結實多。忌與鯉魚同食神效中藥功効素高菽音喬

菽麥多食動氣頭眩和猪肉食脫眉髮。其梗燒灰淋湯

洗牛馬瘡癰。

薑品 薑名蹲瓊又名瓊璫

藥薑四月種、六月收、再種、八月再收地宜瘦

暑月煎湯飲可解暑毒一

漆色碧、多漆則色濁。宜五月種、太早不生角、其年季不  
妊、則薑有收、是即下種、而平而皮寒、脾弱人不相宜。  
治病則歸皮去皮、應氣作枕、明目。

種薑與種穀同時、二月每畝用子八升、三月一斗、四月一

斗二升、五月六月遲加之、五穀皆然

小薑即黃薑、以夏至後十日為上時、初伏斷手為中時、中

伏斷手為下時、後此則非矣、莖黑而薑蒼、便斫、過熟則子落

莖於三四月種、忌即日下種、鋤草令淨地不宜肥、有草則  
削、穀可飼馬、莖其燒灰鹽蛋皆作花

疏莖、諸莖中惟此耐久可陳、且多收、八月種、莢如決明、若

要結實早、以先前二年種種之、極早疏俗言寒食之動氣

種莖、八九月種、有杭糯二種、地宜瘦、江南多種此、塵泥

煮熟、剥去皮、再煮入鹽、一滾、晒乾、火炙、甚有味  
又做蘭花莖、能發氣

豆莖有紅白二種、較而後種、六月收子再種、八月又收、食

醬甚佳

黑莖四月下種、喂馬能肥、故名馬料莖、人食之、補腎明目

忌與豬肉同食

赤苳三月種、六月摘、遲者四月種、凡苳皆要削草而且頻

稀稠得宜、太密則少實

紅苳粒大、赤苳粒小、行小便久食虛人、能損津液。臘月廿五夜煮赤苳粥、

淡則三年大發

大苳忌申日下種、名曰梅苳、鋤成行、壅春穴下

種、早者三月種、四月可食

紅苳即裙帶苳、紅白二種、三月間種、蔓長、杆竹引上、合魚

鮓食、成消渴

刀苳每穴下種一粒、豎種、以灰蓋、或以麥芒蓋、芽出糞澆

蔓長搭棚引上、二種應入蔬部、以苳附此

種諸苴與油麻大麻等若不及時去草為草蟲耗結實少  
矣諺云麻耘地苴耘花麻須初生時耘苴雖花開尚可耘

白藕苴即沿籬苴有白黑二種白者佳而入藥即白亦有  
兩三種清明下種以灰覆之豎種以口向下勿用泥蓋霜  
降後收子未花時澆糞開花而澆糞便不結實用浴湯陽  
溝翻壯泥壅草泥壅之宜稀種葉密則摘去之使透風則  
結實。收第一二三莢作種隔過兩個年朝作種種之尺

許使生莢

太湖頭  
先圖傳

白藕苴久食頭不白

麻類

胡麻一名青葙秋間取八稜者八月如種萊法種  
之生苗可食



胡麻色黑芝麻色白宜肥地亦有黃色者三月種為上時上半月種則  
莢多四五月亦可種白者油多餅以墮田殺草蒸熟食則佳炒則熟生  
則冷其花沿身生肉刺採花擦之。忌西南風下種不忌惡變為草  
胡麻九蒸九晒為末。棗肉為丸服之。治白髮還黑補衰。○黑芝麻炒  
食不生風痛。芝麻油生者止可煎燈煎熟方可食。齒痛及脾疾人忌  
食。○胡麻六高不食宜種之田畔以遮之。

黃麻地宜極肥。忌辰日下種耕地宜熟。殘年開墾候凍過則土疎。  
至來年正月半下種種取黑斑者為上撒後以糞灰蓋之密則細疎則粗。  
布葉後以糞澆三四次諺云麻澆白地菜澆花澆必須陰天恐葉焦。

死七月收子麻布包之懸挂則易出撒灰宜帶露

苧麻正月移根分栽五月斫頭苧七月斫二苧九月斫三苧

二五六月半斫二苧  
八月半斫三苧

其根常留以灰糞壅之上以土草覆之或壓條來年成苧或云月月

可栽若自遠處移栽勿透風日十月牛馬糞壅高一尺二月初耙去糞

其嫩頭可作餅餌○第三年不分則不旺○看根赤便斫根旁出小

芽五分便斫斫遲不唯小芽不旺即已成者亦有損斫了用盤沙麻糞

肥糞壅之

區相懸一尺五寸  
每區二三根

○苧麻正月為上時芽出為中時苗長為

下時○生葉枝則苧皮不長生花則皮老而韌骨不可剝

治白丹用苧葉煎水浴之三四次立瘡○治癰疽發背初覺未成  
膿者以苧根葉搗爛敷之日夜數易之瘡消則瘰癧

種麻肥地一畝用子三升須耕三遍種須稠子取斑黑者佳臘月初八種者佳

三月初旬為上時四月初旬為中時五月初旬為下時留種大率一尺留一稔常鋤耘令淨既放蒔則拔去雄者未放蒔而去雄則不成子○六月中可於隙中散蘿蔔子而鋤之掘收其根○麻高一尺以糞沙壅之陳糞亦可○種宜四月三卯日

棉花穀雨前後先將種子用水浸片時漉出以灰拌勻每一尺作一穴種五七粒待苗出時密則薅去止留壯盛二三稔鋤不厭頻須用大糞澆之或桐油和糞水澆之每本常搯去苗尖勿令高高則不結鈴○苗高二尺之上即掐去心旁條長尺半亦掐之

苧麻刈倒時即用竹刀或鐵刀從梢分批開用手剥下皮即以刀刮其白瓢其浮  
土銀皮自去縛作小聚搭於房上夜露晝曝五七日其麻潔白然後收  
之若值陰雨即於屋內透風處晾之其縹紡過用桑柴灰淋湯浸一宿水  
漂了用細石灰拌勻停放一宿次日滌去石灰用秦藉灰淋汁煮一過自  
然白軟晒乾再用清水煮一過水漂晒乾織

芋經 可憐荒芋註附五殺後

芋之食忌本草云有毒多食困脾滯氣陶隱居曰生則有毒性  
滑尤為服餌家所忌博物志云野芋狀小於家芋食之殺人蓋葢也  
家芋種之三年不收拔生尤不可食劉禹錫云十月後晒乾收之冬  
月食不發病他時月不可食久食則虛勞無力多食動宿冷○紫  
若毒少青若毒多廣中有重至十斤者一名土芝一名蹲鴟一名蒨  
懷○說文曰大葉實根駭人故曰芋徐鍇曰芋猶吁吁驚詞也故曰  
駭人齊人謂之苦芋經援神異謂之苦芋廣雅謂之渠芋葉謂  
之蕒載廣志凡十四等有曰君子芋大如半冠如杆旅有曰車轂芋

有曰鋸子芋、有曰旁巨美、有曰青邊芋。此四芋多子。有曰談芋魁大如瓶、小子葉如傘、蓋紺色而紫莖、其長丈餘、易熟、是為芋之最善者。莖可作羹、腫肥澁、得飲乃下。有曰蔓芋、緣枝而生。有曰鷄子芋、色黃、有曰百果芋、魁大而子繁、畝可收百斛。種以百畝、葉以養猪。有曰旱芋、七月熟。有曰九面芋、大而不美。有曰象空芋、大而難使人易饑。有曰青芋、曰素芋、皆不可食。○芋有六種：青芋細長、毒多、初煮須要灰沐、易水熟乃堪食。白芋、員芋、連禪芋、紫芋、毒少、蒸煮啖之。員白禪芋可煮肉作羹。野芋大毒、不可啖也。陶隱居謂之老芋。形葉相似如一、根並殺人。垂死者、飲以泥漿、糞汁可活。葉俞縣有百子芋。

新鄭有博士菜、蔓生而根如鷄鴨卵、今有南京菜、莢之可粘皮而食、甘滑異於他品。茅山有紫菜、吳郡所產大者曰茅魁、旁生小者曰茅妳。○畱種株、莢長尖白者、就南簷下掘坎、以簍糠鋪底、將種放下、稻草蓋之、上覆以土。○秋芋之法、二月種爲上時、掘坎深三尺、以糞、其置坎中、足踐之、厚尺五寸、取糞和土加其上、厚尺二寸、擺種其上、肥泥覆之、日澆水一次、隔日亦可、待苗發三四葉、四月終移栽、相懸七八寸一棵、芋差三日、衆人來往、眼日多見、及聞刮鑊聲、處多不滋胤、須避此數端。天雷頻則多子、種時不可呼其名、每畝可種三千棵、或用河泥、或用灰糞、或用爛草壅培、一發便佳、若不肯長而後

壅之終不肯長。俗云將軍性也。旱則澆之。芸去其草。乾一二日。其根  
乃行。不乾則根腐黃而不生。乾至小小土坵。即上水。若大坵則乾壞。  
失常使潤澤。種時天陰為佳。至七月乃塘。塘法在芋子四角之中掘  
其土。遍畝皆然。壅在根上。則土緩而結子。員大霜降後起之。凡種二  
歲。必再易田。不然則不長旺。所易之田。種稻最妙。○早菜於二三月  
杭州買白者方足。須求鬆土淺耕下秧。俟秧出後耕地。懸開三四寸。  
一棵種後以肥土厚壅其根。日以水糞澆之。苗長則不必。莖旁生小  
者尤多於水菜。○其莖葉解蜂螫毒。如蜂螫。擦之即瘡。

蓋宜平地耕熟種之。爬勻上。用荻簾覆之。每日早用水洒。至生苗去荻。



有二種如茨  
菜一如辣菜

簾長至四寸高以熟肥地作畦打溝成行離五寸栽一窠每日用水澆灌如地瘦則用清水糞澆一二次至七月收刈搽藍取汁○每藍一擔用水一擔將葉梗切細於鍋內同煮數百沸去渣以汁盛缸內比熟藍三停內用生藍一停摘葉於磨盤上手搽三次用熟汁澆柳濾相合以淨缸盛之仍存藍根候開花結子八月收來春三月種之

穀於舊年八九月耕地爬平臘月復耕一次下種臨種時又耕一次三  
月內種之撒種後橫道復爬三四次候生五葉時即鋤有草再鋤至  
五月收刈打穀○夏至前後看葉上有破紋方可收割每五十斤  
用石灰一斤於大缸內水浸次日變黃色去梗用木杓打轉粉青色

雙過至紫花色然後去清成醪。六月可種冬菜

作園羅法於秋實熟時收子隴頭概種之至明年秋後約高三尺斫去  
惡者相去一尺畱一棵要稀稠勻行列道至來年春削橫枝必畱距  
否則凍死種刺榆及柳亦如之次以五加皮冬羅摩並種爲藩羅甚  
固 又法於臘月收槌樹子小蒲包盛浸厠中五六日取出用大草  
索每一轉中下一粒從溝隨意轉折二三年便長四五尺挨轉交互  
作牆光於次年將各本身辦緊

去園中橫蟲切海魚一斤搗爛浸水隔一宿洒之頓除

此法得之太湖老圃洒菜尤驗又或多取葦麻子葉浸厠中半月澆  
之亦可

鯪鰾汁停冷浸百樣種一宿晒乾候他日種出時不生蟲凡菜有蟲  
用苦參根并石灰水澆之又用泥礬煎水澆之又法用菜餅碾成屑  
用菜油拌撒亦妙

弄風日不可種菜春秋社前庚日秋社後巳日

### 蔬品

茄子 冬瓜 韭菜 蘿蔔 胡蘿蔔 茺萎 葱 蒜 菠菜

莧菜 苦蕒 菜豆芽 蒿苳 薑 薺菜 藏菜 芥菜 甜菜

香菜 木耳 菌 露葵 苣荬 蕺菜 夏秋王瓜 山藥

絲瓜 蔓菁 南瓜 北瓜 黃獨 薺菜 蓴菜 芥 薺

紫菜 黃芽菜 蕪菜

水果

凡種水果宜用牛糞大忌桐油桐油瓶蓋拋入水中便絕種即新船亦忌

果品

菱 鵲豆 荔枝 茨菇 藕 西瓜 甘藷 天茄 香芋

落花生

種菜吉日 壬戌 辛卯 戊寅 庚寅 凶 日 春社前 庚日 秋社後 巳日

種瓜吉日 甲子 乙丑 庚子 壬寅 乙卯 辛巳

種蔥吉日 甲子 辛未 巳卯 甲申 辛巳 辛卯

種蒜吉日 戊辰 辛未 丙子 辛巳 壬辰 癸巳 辛丑 戊申

種芋吉日 庚子 壬戌 壬申 辛巳 壬午 辛卯 戊申

種薑吉日 甲子 乙丑 辛未 壬申 壬午 癸巳 辛卯

茄子發瘡腫動痼疾損精神秋茄尤不宜食清明浸種沿畦種之稍舒辦則分棵再排種之謂之紮秧長二三寸著五葉因雨移栽栽時以硫黃少許著根下有日色須蓋之其茄長大味甘開花時摘葉布走路以灰圍之結子加倍謂之嫁茄用桑坊淋湯過淡灰晒乾窖之藏至冬可食深秋葉連莖收之可以飼蟹○凍瘡用老黃茹子白茹煮湯洗之愈○白茹常與何首烏陰乾用華七條同何首烏等分煎湯治對口瘡

冬瓜一名菰音性走而急陰虛人久病人勿食忌冷食宜乘熱食多食陰溼生瘡發痘九月勿食老人中其毒至秋為瘡痢霜降後

名懶人菜以苦  
不須或種也

芥菜也  
如佳正月晦日傍牆區種之令其緣上長三寸深五寸著糞區中  
花開即不可澆糞澆則不結皮煎湯洗凍瘡其梗彎入瓜蒂內者  
為雌作種生子久九月看霜厚者方可畱種九月取藏高燥處忌  
犯酒醋氣掃帚貓犬觸之皆敗八月斷其梢一本止畱五六枚十月  
霜足收之早則爛○經霜皮用朴硝煮汁洗翻花待立效如無冬底以  
韭菜蔴代之  
韭性暖號草鐘乳二月下旬撒子以酒鍾覆地沿盆邊撒子韭性向內  
不向外初歲惟一剪素之勿食須候其味為容糞也其根性向上忌  
零陵香礬根消滅○每五年再分種九月將根分栽選嫩者區種  
之去其老者灰糞壅蓋三寸厚薄土加之則不被風吹初年止可

割四五次。次年二十日一剪。剪訖即以人溺澆之。肥灰土壅之。杞櫟之

勿使根連。則葉潤如蔗。剪須極早。或晚間諺云。觸露不掐菜。音日中

不剪韭。○冬月用馬糞壅亂草蓋。用騾糞壅者尤妙。不專言冬也。

鷄糞尤好。○出崑山圓明村者佳。八月韭花名韭菁為上品。○正月

韭黃滯氣動風。忌同牛肉食。成癰。忌同蜜食。能殺酒。後忌食。○全

人目昏神暗。

三

四五月六七月勿食八月甚宜。十月勿食。

藍菜出陝西。二月畦種。苗高剥食之。刀割則不長。加火煮之以水淘浸。

或炒熈。或拌食。或餛飩。或捲餅。生食有辛味。五月甚茂。又名玉團菜。

食至冬月。以草覆其根。四月終結子。可收作芥末根。又生葉。又食一年。



蘭香即香本名羅敷中國為石勒謀改今名三月方可下種種同種葵法及

水散子乾徒熟糞僅得蓋子即止厚即不出弱苗故也晝猶蓋夜去之生即去箔

常令足水六月連雨拔栽之楊心坤泥作苗及乾者九月收乾惡作乾者天晴

時刈晒地薄攤即乾按時甕中拔根懸者衰爛又有雀糞塵土之穢

取子者十月收○燒馬蹄羊角灰春間散著溼地即生

蘿菔名電大損人月月可種地宜極鬆極肥澆宜肥頻撒子出後宜

莫使稀宜多鋤以大梨剝去其核留頂作蓋納子其中埋地中候

梨爛取出撒種則佳即名菰盧菰方言燕下氣耗血消食中氣虛者忌食

蘿菔力弱人不宜食生者滲人血臘月多用糞澆幾次即肥太七月

宜多鋤、但勿帶露、帶露鋤則生蟲、生蟲搗苦參水、石灰水沃之、根莖  
紅者為蘿菔根、莖白者為蕪菁、亦名菰菜、亦名來服、山東名菰、速  
紫花者曰盧菔根、實粗大、取子者、草覆過冬、否則凍死。五月犁五  
六遍、六月六日種佳、流水淌畦、候水滲盡、撒種於上、勿稠、夏至後收子  
水蘿菔正二月種、六十日根葉俱可食、大蘿菔初伏種、水蘿菔末伏種  
白蘿菔煮湯洗痔有效。食傷取子炒食。有排山倒海之功、但剋伐之  
物不宜過服。○女人小便不通、子炒香、白湯吞數錢、主通。

胡蘿菔宜三伏內沿畦宜極肥、澆宜頻、初伏種為上、時秋初尚可種  
常熟者佳

得而即棄  
求地之澤下  
也

芫荽隔月出將子擇開四五月晦日晚宜種地宜溼以灰蓋之水流易  
長忌與青魚同食痘瘡不發煎湯服之燒其根其香可發痘

久食令人多忘振發痲病損精神

蔥名葶藶

音除

八月末旬將冗鬚去盡疎行密排種之猶羹鷄鵲鴨羹和

粗糠壅之又有四季蔥栽不拘時有臺蔥四月二十日分龍日分栽有胡

蔥綿蔥馱夏蔥收子必薄布陰乾者始出。冬月勿食食多發熱

有兩丫者有毒不可食。生蔥與蜜食下痢腹痛。食燒蔥啖蜜

壅氣雜鷄雄白犬肉食之九竅出血大抵功在發汗多食則昏人神

蔥不翦不茂翦須旦起避熱四月後翦至八月止翦與地平高畝則無

葉淡翦則無根 又有蕒音水晶蕒出江西八月間以牛馬糞糠糝

拌和蓋之上以芝麻其再蓋一層勿令生草來年五六月收水晶蕒薑醋浸

蒜於九月初以耕密栽候來春二月先將地熟鋤犁數次用極濃糞

酵之再翻轉耙勻手持木板五寸插一窠栽一棵若無雨以水流之至

五月大如拳。又法耕地四邊作圍以乾糞鋪滿上加土以蒜瓣擺其上

再加以糞用麥糠蓋其上仍覆以土又法以草鞋浸小便缸中將種

包在內夾糞土栽之上糞令厚其大如碗。二月中鋤三遍則蒜大

勿以無草不鋤也拔薑時頻澆研麥時人多食以酥暑毒。多食則

髮早白。忌與青魚同食吃過口臭好栗子數枚可解。鼻衄者

煨爛塗脚心。血止。急洗却。○蒜久食傷肝。氣損。日弱。陽多。食蒜行房。○傷肝氣。面無光。卵軟。破臭。○種二年則大之極。其法以稻草間蒜行中。不爾則凍死。

菠菜亦名雨花菜。七月至二月皆可撒子。隔月出。每於下旬以水浸子。殺軟。撈出。候乾。以灰拌撒肥地。糞水洗。芽出。惟用水洗。待長。仍以糞洗之。食不盡者。滾湯內掠熟。曬乾。四五六七月溫水浸軟。調食甚美。○多食冷大小腸久食脚軟腰痛。

亦名赤根。夏至後收子。七月終便種。種至二月止。

莧菜隔月出。二月下旬移種。摘嫩苗吃。其莖復發。○暑天以葉蓋飯。

上則不饒紅莧菜煮汁煮生麻布則色白如茶。○莧多食動氣

煩悶與蟹及蕨食生癰

字彙云除醫

絲瓜短者黃南京有長至三尺者種後於近根處劈開嵌銀珠少許以泥培之一名龍蹠又名虎掌又名羊駝兔頭

若連種法同蘿蔔二月下種四月移栽留食不盡者地凍時出於煖處

收藏來年春透栽以收子

非江由種

豆芽菜將菜豆揀淨河水浸二宿候漲以新水淘淨控乾用蘆席

洒溼鋪地揀置於上濕草薦覆之其芽自長

荏菹二種在作油色綠可愛其氣香美

荏子秋末或可醬食荹以作菹長二寸則熟細切鹽漬食中大長并莢五月荹可為齋

苦蕒音二三月下種待長治畦分栽宜密用糞水澆夏月食之益心

蕪婦忌食

即芥菜也收非時種常令足水最渴鹹水澆之即死性宜繁茂而甜脆勝野生者白蕪尤宜糞歲可收

蒿苣八月下種待長分栽肥地秋社前一二日種者霜降後可為淹菜

如欲出種正月二月種之九十日收澆要日中不宜早晚久食昏目

能動使痒

藏菜四時可種諺云生菜不離園但至冬間可鹽久耳若發莢開

花而結子始賤終貴不結子則賤

油菜即菘棵菜一名菹菜八月下種九十月治畦春穴以糞灌滿然

後揀菜肥土壓之類用糞水澆十二月勿澆恐結冰也至開春則草

澤則澆不厭頻二月中摘心為菜莢則四面莖生諺云麻澆白地

菜澆花摘英後澆糞曰淋花糞子可榨油餅可墮田○下菜秧  
宜早諺云若要菜秧大莫故寒露過種時以糞醱草河泥每穴  
下之更妙遇而風及九焦日不可澆凡種菜忌弄風日春秋社前  
忌庚日十日秋社後十日謂之弄風旬日宜庚寅辛卯壬戌戌寅日

芥菜水白菜菹菜烏菜七八月下種九十月分栽○芥菜多食動  
風發氣與兔肉食成惡疾

香菜以洗魚水洗則香而盛米泔及泥漿水洗亦可用糞則不香泔水  
亦可即名蘭香又名羅敷



莖似韭而粗長澗菜二月三月八月九月種諺云葱三薤四移葱者三支  
為一本移薤者四支為一本然支多者棵圓大故以七八為率正月上辛  
日掃去畦中枯葉下水加糞葉生即鋤不鋤則瘦五月錄也六月初  
耕也葉不用翦則損白供常食者別種九月十月出賣薤肥  
健人生食引滯唾與牛肉食成瘕

菌萐參月方種用穀樹爛木埋於陰地用草蓋常以米泔澆之令  
溼三兩日後即生○一名中魁又法畦中用爛葉取朽木長六七寸  
槌碎如種菜法畦中勻布土蓋水流常令潤如有小菌即摧折之  
明旦又生又摧之如此三次後來便大若無棚及非常大者野生者下

必有毒蛇食之殺人如中葦毒急服薑汁可救。煮時用燈心一握或銀器同煮而黑者殺人。菌有毛者下無紋者夜有光者煮不熟者煮訖其汁照人無影者皆殺人。楓樹菌食之笑不止而死誤食者掘地坎攪泥漿水飲之解。取桑榦木一尺長臘月擇陰肥地掃爛葉埋於溪畦土蓋水潤春月米泔不時澆每日二次木上生者不傷人取之晒乾可治地臭。采木宜用丁開日。

木耳亦有生于枯樹上者一名蒼朮楮柳桑榆之耳可食有赤色仰而不覆及野田中生者皆毒。

種薑宜耕熟地七八遍極肥令溪三月種之一尺一稜帶芽大三指以

蠶沙或腐草灰糞牛糞覆之、每壟濶三尺、便於澆水、待芽發後、有  
草即耘、又掘去老薑、漸肥土蓋之、五六月作棚蔽日、類以牛糞浸水  
澆之、八月收取、九十月掘溪窖、以糠粃合埋煖處、以爲種、置火間亦  
可。○夜間不可食薑、動氣、霜降後可食、八月中若發病、九月九日勿食  
薑、傷人損壽、秋不宜食、蓋秋味辛、辛乃秋之本味、故忌之。○衣沾泥  
杵汁洗可無跡

五月種者可  
于待霜降後

露葵早種必秋耕、十月末地將凍、撒子種之一畝三升、正月末撒子亦可  
得人踐踏乃佳、地溼即生鋤、不厭煩、五月初更種之、六月初一日種白  
葵、秋葵堪食、仍留五月者、取子於此時、附地剪却、春葵全根上耕

生者。桑軟美於秋葵。搗秋葵必留五六葉。凡搗必待已時。須八月半剪

去。耕生肥嫩。比及收時。高於人膝。莖葉皆美。子雖經歲不泥。臨種必須

晒之地。肥鬆為妙。畦長兩丈。闊一丈。便於澆水。糞。磚泥蓋之。厚二寸餘。生

三葉。然後澆之。澆須晨夕。晝不可澆。一名葉莧。○葵同鯉食。能害人

生食。癩一切宿疾。允服。藥忌食。同沙糖。食生流癖。○又有鴨脚葵。白莖

者。莖乾紫莖者。乾則黑而澁。○神隱云。其菜陽草也。開花白。朝至暮隨

日而轉。古謂之向日葵。廣志云。其花紫赤者。紫莖白莖二種。

莖菁子。欲陳以乾。鰻鱗魚汁水浸之。晒乾種。則無蟲。七月望後種。一名薺

薺。宜并入蔬類傳下。

苜蓿畦種七月下種如韭法一剪一上糞肥糞然後下水每至五小燒去枯葉即樓斫其棵土則不度一年三刈其留子者一刈即止此菜長生不必再種食之甚有益春初生收為羹甚香為乾菜亦可長則飼馬○酒疸病非此不治

蓼荷宜樹陰二月種之一種水生不須鋤耘加糞旱者以土蓋糞上八月初踏其苗則滋茂九月初取其旁生根者作種亦可醬食十月以礬糠遮之不凍死二月掃去

秋王瓜畱夏王瓜初結第一條勿採養成種子六月初六日下秧不使地乾則芽易生不必移栽即搭棚灌溉七月便生○夏王瓜

瓜名辰瓜  
二月辰日種也

二月下種長寸許鋤穴分栽每早以清糞水澆之早則早晚澆蔓長搭棚引上未出芽不可澆糞一云白者名早王瓜青者名晚王瓜用熟坊淋過淡灰晒乾藏之可至冬用一名落鳩又名土瓜

甜瓜多食動痼疾發虛熱沉水者殺人雙蒂者殺人患脚氣人食之疾永不除二月下種每粒離寸許以溼灰篩蓋之河水洒之又用糞澆乾則澆水待芽頂灰於日中將灰揭下撓碎墮于根旁以清水糞澆之三月下旬鋤穴分栽一尺二寸一穴多鋤則饒不鋤則無實濃糞灌之九種瓜法皆同以蒼魚骨挿頂上易熟蒂落一名無餘縑一名白酥一名蒲鵠○旦起露未解以杖舉瓜蔓散灰於根下後一二日後以

土堆其根則絕無蟲患。○冬天以瓜子納熟牛糞中凍過拾聚正月  
種之。○收子作種用中央子近蔓生者早生早熟而小蔓末者晚生而熟  
遲近蔓本者生子曲而細蔓末者生子短而喝唯中央子作種為佳根  
旁宜種紫蘇以遮日。○二月上旬為上時三月上旬為中時四月上旬為  
下時五月六月可種藏瓜忌麝香餌。○龍蹄獸掌羊髓兔頭四者皆瓜屬  
金銀虎蟠玄肝素腕皆瓜名  
凡瓜所以早爛者皆由脚躡皮摘時翻動其蔓故也採時宜慎之有蟻  
以牛羊骨有髓者引素二三骨則無蟻矣、

茭苺不可多食不可令生菜食不可雜蜜食發痼疾傷陽氣宜水  
田沃栽逐年移換則心不黑多用河泥壅根則色白。○春生者名呂公  
葵

山藥忌用人糞二月內先將肥地鋤淚潤二尺餘哈長二丈通水路底用磚鋪用四尺將肥泥布滿用四尺長木椎揅肥泥淚二尺每懸五寸許每孔先下麻餅末半合再加牛馬糞土一尺後以有白芒刺山藥用竹刀切作段長二寸許豎在內後以牛馬糞土填滿旱則水澆不宜太澤麻餅墮培生苗以竹木搭架霜降後收子種亦可但遲不早肥膩根邊四圍寬掘淚取則不碎一坑可供一年之用晒乾作粉 糕兩廣有至二三十斤一條者近出嘉定後儀然易爛出徽州濟寧者佳一名玉延一名薯蕷一名脩脆大則名薯蕷小則曰山藥

黃芽菜出北京不可經冰霜以蘆蓆覆之葉脫色改而後成

菜中神品



南瓜紅皮北瓜青皮結實多其家必有禍與羊肉性相反

薺菜出南京空中而味脆種盆中携歸取食播之地不生

黃獨味與山藥同以萊菔殼麻紙或小便浸草鞋包種之四畔用灰  
則無蟲傷損

薺菜冬月食之至二月初止清明日日出時採其莖作燈杖能使  
蟲不撲油盞內。三月三日收鋪床席下去垂鋪甕上除蚤蟻。同麪食  
發病

蓴菜一名水英亦名水葵葉似鳧葵八九月肥脆出泖湖即用湖水浸方  
佳杭之西湖紹興湘湖皆佳三月至八月名絲蓴九月至十月名塊蓴  
者在泥中。性滑發瘕同醋食令人骨痿疾病後食之多死

芹生高田者宜食赤色者害人和醋食之損齒。白者名荻芹取根  
赤芹取莖葉一名水英宜常食

瓠即扁蒲多食令人吐

紫菜有毒中有小螺蛳大毒多食腹痛發氣飲少熱醋可解

莢菜芥之大根者北京大而腴南京次之若吳地則小矣最益人常食通  
中益氣令人肥健六月下種七月種更好不生蟲葉可採亦作乾菜子可榨  
油一畝用子三升油點燈甚明塗髮能變蒜髮○今江北亦有之春食莢夏  
食心秋食莢冬食根陝西多種之○四月收子

莢菜一名水栗莢名薺菜兩角為莢四角為莢有青紅二種七月  
初生曰淺水紅進而大曰雁來紅青曰鴨哥青進而大曰銀鈍莢

又大者曰編幅菱吳縣地名曰橫塘吳江地名泥窰菱產崑山婁縣亦佳  
長洲曰顧窰蕩重陽收穫老黑者用籃盛水中待二三月發米用竹一棍  
削作火通口樣鑲住老菱揅入水中若澆煮用大毛竹打通節注下種  
之前須剪盡水中草更有烏菱出湖州即菱之極老沉水者若淺水紅諸種皆  
菱也其花夜舒日斂屬陰分性極寒冷不可多食多食冷臟傷脾

芡實俗名雞菱一名鴻頭曰雁喙曰鵝頭其花日舒夜斂有杭糯二種  
秋深收取老子以蒲包包之浸水中三月撒淺水內待葉浮水面移栽  
深水每棵離四五尺先以麻餅莖餅拌勻河泥種時以竹或蘆揅記根  
處十餘日後每棵壅河泥三四碗出處杭州崑山第一吳江第二車

坊第三新門爲下製芡實粉法去殼磨成粉加水漂待清入包袱  
吊起滴水乾再晒搗爲粉其性平味薄氣清補中調胃益心血壯元  
陽之聖藥也入粥中甚佳。生食動風冷氣損脾熟則益精。凡食  
鷄豆細嚼足致上池之水。根可醬可作菹皮亦可醬食

荔枝一名地栗一名鬼茈正月畱種取正而大者待芽生埋缸中春  
溪移種水田中至茂盛於小暑前分種每種離尺五許冬至前後起之  
耘耨與稻同墮用薑餅及糞作粉可解瘴毒遊粵中者宜携之白  
皮者擦小兒乳癬吳江華林爲上品但不耐久長洲出陳灣村者  
佳

芫茹動宿冷氣腹脹小兒食之臍下痛本名烏菜又名燕尾菜又名田  
酥又名水萍又名槎牙臘月折取嫩芽揅水田中來年四五月如揅秧  
法每棵離尺五許肥田則茂每棵生十二枚閏年生十三枚摘其莖葉  
如泥塗惡瘡及小兒避癰丹毒立消

芙蓉行藕如竹之行鞭節生一葉一華華葉常偶生故謂之藕燕燕  
熟則開胃補五臟實下焦連肉生者動氣脹人熟者良藕出西湖者  
甘脆爽只與護安村同區眼者尤佳其花白者香而結藕紅者艷而  
結蓮國史補曰蘇州進藕其最上者名傷荷藕或云葉甘為蟲所  
傷一云欲長其根故傷其葉出吳縣黃山南蕩者最佳花白者鬆脆

且甘即傷荷藕也食之無漢他產不滿九竅此獨過之以此為辨。藕以金壇為最花時所取為花下藕尤甘脆今以高郵者為尚土人食之不以為美過江則味愈佳且久藏不變。初春掘取藕梢三節無損者挿入溪泥全到硬土數兩前可種以酒糟塗藕亦可墮用糞與芷餅種缸中荷花惟大紅十八瓣為上品即種池中水蕩中取蓮子以此為上用猪毛鋪缸四周去藕寸許加硫黃末更妙宜清明前種。藕荷葉遇雨而雨所著處皆成黑點藏荷葉須密室見風則蛀損不堪用製藕粉法取粗藕不限多少洗淨截斷浸三日夜每日換水看灼然潔淨澆出搗如泥漿以布帛絞淨汁又將藕渣搗細又絞汁濾出濁者以

清水少和攪之然後澄去清水下即好粉凡製粉與蒸熟皆用湖州產者其藕眼大容米○藕生食除煩渴解酒毒○久食輕身耐老止熱破血○藕生應月月生一部閏月益一部

製蓮粉法蓮肉不拘多少先以水浸漲洗去紅皮揀去心連水磨成漿以絹袋紐去渣再磨一次再紐一次加水漂去涎水待清起在包袱內平起滴水盡晒乾搗成末磁器貯用性溫味甘氣薄補中益氣壯心神消水穀除驚悸實肌膚聖藥也○宜蒸熟先去心生則脹腹不去令人嘔○以蓮子磨薄頂上浸鼓缸中明年清明取出種之花開青色西瓜清明時於肥地掘深坎每四粒擺四角芽出移栽栽宜稀澆宜頻



喜牛糞蔓短時作綿兜每朝取螢恐其食蔓待茂盛則不用餘糞  
花摘去則結瓜肥大甘美吳縣出薦福崑山楊莊園明松江枕頭瓜崇  
明亦佳若日以為常供亦損脾胃

用臘月醉壯泥排子於上再用糞酵灰蓋常以牛糞浸水洗俟長移種  
發蔓亦須肥涇河泥壓藤上凡生一瓜則蒂邊必生一蔓連摘去勿使  
分力以指彈有空聲則熟矣○五代鄆陽令胡嶠於田能得種以其出  
自西域故名西瓜又云西瓜最惠移栽必子出本土者可多結小藤為  
賊藤宜去之用薑餅於黃昏時覆根上明旦去之如此三四次則瓜甘  
美○多鋤則結子不鋤則無實摘時莫翻動其蔓莫以腳躡要瓜

大一蔓止留一瓜餘蔓掐去

天茄清明撒於肥土蔓長搭架扶上色青長寸許熟時採得鹽湯焯

晒乾可以供茶。狀若茄子而小

出嘉定

亦可種牆腳下嘉定牆上

甘藷用猪毛和土必長茂地須耕四五遍方好喜肥糞三月開長溝以密

節壅臥溝內鬆土蓋之早則二三日一澆雨夕則十日一澆苗出用麻餅肥

糞壅仍去旁生小苗止留大者潮沙之地為宜一名諸蔗孕婦忌食其

汁晒乾為石蜜即牛皮糖。多食蝕血。苗高二尺頻用水澆

香茅於二月間用極鬆肥土掘成溝用鷄糞灰密蓋發藤以竹引之

掃地剝剝覆之生子肥大

出嘉定

性畏寒十二月中起則甜而不土氣以

蒲包藏煖處

落花生宜栽背陰喜肥土灰墾未經霜則味甚出嘉定

栽植移接花木吉日

栽植吉日 宜天倉六儀母倉生炁黃道除滿成收開日 忌死神死氣已

日建破日 宜甲戌丙子丁丑己卯癸未壬辰四相成日每月己亥甲午癸未日

移接 宜除滿成收開閉四相成日

逐月種植吉日

丙子戌寅己卯壬午癸未己丑辛卯戌戌庚子壬子癸丑  
戊午己未己亥丙午丁未乙卯戌申己巳

種果凶日 壬戌

花果旺日

乙丑己卯甲午乙未丙申丁酉戌戌  
己酉庚戌辛亥壬子癸丑

種花器具

桑剪 并股 用以各泥 鐵鉤 鐵針 木杓 鐵鋏 鋤頭  
破刀 鋼線 鐵線 用以燒打腐頭上開下 真杓 水桶 篩泥篩

大鋤 鉄鋸

手鋸 分鑿

宜忌種接灌壅諸則

種果樹各隨<sup>地</sup>之所宜。古人云。木奴千。無凶年。廣種多植。有久遠之利。去園國中蟲。正月初一四更時。火把徧照一切果木。則無蟲災。又清明日四更時。以稻草縛樹上。則不生蠶毛。○端午日以粽箬挂樹上。勿令人見。則不生蟲。○果樹有蟲。蟲者。以荒花納孔中。即除。百部葉亦好。○以硫黃雄黃作烟熏之。○或以爆杖藥。加硫黃入缸。取燒之尤妙。○正月間。削杉木砧。釘塞其穴。亦妙。○或用桐油紙燃塞之。○去蛀蟲。用鐵線作鉤取之。上半月蟲在上半截。下半月蟲在下矣。

鑿果樹納少鍾乳末。則子多且美。○樹老以鍾乳末和泥。於根上搗。

去皮抹之樹復茂。○果實異常者根下必有毒蛇切不可食

生人髮挂樹上鳥不敢食其實。○凡樹望前種實多望後種者實少  
花果樹如經孝子孕婦僧尼手折來年花不茂實亦少結

果子被人盜吃飛禽便來吃。○凡摘果不必太熟若熟透則抽過筋  
脉來年不茂。○摘果用雙手則年年熟。○果實不牢者宜社日春  
其根以米撒於樹下其實不落又云諸果茂而不實以祭社餘酒洒  
之後澆樹根。○果樹見麝香則花落不結子。○果樹生小青蟲將  
多年竹燈檠挂樹上旬無。○元旦日未出時以斧斑駁椎砢各色果  
樹謂之嫁樹栗栗尤宜。○園中宜種百部百蟲不生。○有蟻穴羊

膏香膏油引出之。凡樹搗麻油查，雜糞灰塵之，則枝葉茂。早晚以花

噴漬水潤其上，則下自潤。四月初八晴，其年果實必熟。

草木被羊食者不長。果樹花謝時，天晴日暖，結實必多。遇雨實必

一切樹木於正月去澀水枝向下，刺身條向，駢紐枝連交，冗雜者多而

風枝細長，旁枝新發，或截去大枝，以糞塗之，再以馬糞和泥壅其處

四月初七剪伐枝柯，則不生蟲。

凡諸果樹寒凍則少實，預貯亂草乾，候嚴冬雨初晴後，北風寒冽，是

夜必有濃霜，於近樹處堆草煨烟，可以拒霜。龍糠可代。棘能開

霜，冬月花果以棘圍之。果樹欲死者，用菜油入根可活。

果須候肉爛和核種之。尖頭向上。○正月十二月未發芽時、從根旁寬  
深掘開、截斷直下根、勿傷四邊、亂根、隨用肥土覆好、茅實則結子肥  
大、謂之騙樹。○以大蒜一搥、甘草一寸置坎中、然後種樹、則無蟲患。

凡栽樹木、以小牌記其陰陽、不令轉易。大樹斃之、小則勿斃。先掘深坎、  
以大麥和河泥、猶糞傾坎內、中畱低墩、將樹放下、東西南北、揀之良久、  
然後下土、茅實埋之、欲深、勿令挽動。四旁釘木椿、以繩索維之、恐大  
風撼之也。雖尺許之樹、根搖則不活。栽訖、莫將手摸、勿用腳踏、及六  
畜抵觸。○凡種樹、正月為止。時二月上旬爲次。九月十月上旬亦可移。  
損餘月不宜。○春分後不可移。秋分後方可移。○樹一移、三年方復元神。



凡移樹不要傷動根鬚須澗掘壅不可去土諺云移樹無時莫使樹知  
春花半開者摘鶴膝下即挿蘿蔔內盆種之灌溉以時可以生根

凡木皆有雌雄雄者多不實可鑿木作方寸穴取雌木填之乃實  
一切花樹下勿使生草若有坎潭積水則樹根朽敗

木自南而北多苦寒而不生只於臘月去根旁土取麥糠厚覆之然  
火成灰溪塘如故不過一二年皆結實若歲用此法則南北不殊猶人  
灼艾耳○凡樹遇火日及西南風西風地火九焦月殺建破百蟲食  
日地蟲日勿移栽○壓條以木鉤板釘於地煨土壅之次年截斷  
三年移栽  
凡花木之愛須種大蒜蔥薤之屬以辟瘡花木最忌腐爛瓜尤忌

之倘為所觸、急於上風燒硫黃辭之。○凡接矮果及花用好黃泥晒乾篩過以小便浸之又晒又篩又浸九十餘次以泥封樹枝用竹筒破兩片封裹之則根易生、次年斷其皮截根取栽之

果實經數次接者核小但接不可作種。○三月下旬取果木斫取好直枝如大指長五寸納芋魁中種之或蘿蔔根亦可勝於種核、核出者須四五年挿芋魁者易長

木生之果八月間以牛羊糞和土包其鶴膝以紙纏裹麻縛令密以木撐定用水頻洗明年季秋開包則根生矣斫斷栽之。○又法選兩樹相近者嫩枝長尺餘兩邊各刮去皮寸許用有節竹管劈

而開合著樹枝實縛住內以糞土罩實其根自生常以水潤之驚蟄前  
後及八月皆可。○凡果及桑以接剝為妙一年後便有收成所接枝條  
必擇二年枝向陽近下者氣壯則易茂背陰嫩條柔弱而難成根枝  
各從相似者接之時日惟在暄融既得陽和之氣人為之巧封繫之  
圓接培之厚不使疎淺而寒凝又必趁暄春分前十日為上後五  
日為中秋分亦如之接頭須今在土外○花木雖已接活內有脂力  
未全接完處須包護之若霖雨浸其皮即不活接工忌食酒厚味  
腥物恐津唾穢濁也用細齒鋸一把連春利刀一把接法有六一日直接  
先用鋸截去元本樹莖高可及肩以快刀際其盤之兩旁微啓小

罅隙半寸先可竹櫟之測其淺深即以所接條約五寸長一頭削作小筍子先嚙口中假精液以助其氣即納之罅中皮肉相對插之用殺樹皮或桑樹皮封繫寬緊得宜用牛糞河泥斟酌塵包勿令透風見日土乾則水洒之接貼枝外仍畱一眼以泄其氣以箸作單套遮日色若舊本生葉須去之以泥塗之

二曰根接以鋸截斷无樹皮地五寸許以所接條削皮插之如身接法就以上培封之棘圍護之

三曰皮接用小利刀於无樹身八字斜剗之以小竹櫟測其淺深所接枝條皮肉相向插之封護法如前從接枝茂盛斬去无樹枝莖使所

接枝並條連 四曰枝接如皮接之法而兩樹身近即前選兩樹相近之清 五曰壓接小樹為宜先於无樹橫枝上截了雷一尺許於所取接條樹上眼外方半寸刀尖刻斷皮肉至骨併帶旋揭皮肉一方片須帶半心揭下口喻少時取出印湮痕於橫枝上以刀尖依痕刻斷无樹壓處大小如之以接之上下兩頭以樹皮封繫寬緊得宜仍以牛糞河泥護之隨樹大小酌量接之

六曰搭接將已種出芽條去地三寸許上削作馬耳將所接條併削馬耳相搭接之封繫糞壘如前法接樹之法是變稜莠為嘉禾易珽珽為美玉也

接樹先梅李桃李次棗栗梨柿次柑橘橙柚惟金柑尤宜遲蓋氣未動而接者多不活。○凡接樹雖活本身若有氣條發出急宜削去勿令長大分力。至有本身茂而接貼萎敗者以本身得氣在根也。至秋後忌澆糞花木過肥開花結子太多易敗。○以青草穽陽溝泥水畧缸內自化清水可以澆花木。祇宜早晨用此。夜涼宜河水雨水噴之。晚勿澆肥。

霖雨時不宜澆肥肥則根爛。白露後不宜肥。時初生嫩根非獨無益更且有害。○二月亦是澆糞。○烈日晒後不可澆酒。○暑月宜消臘月宜厚糞。必糞熟則成清汁。枯樹澆之亦活。至佳。○凡花果忌暴糞。雖臘月亦宜用。隔年者。春秋只用別樣肥物為妥。○新糞殺草木。○猪糞和土。

熱過陳久冬溪壅樹。草木發芽不可澆糞。花開時不可澆糞。發芽  
於上下使行根。俟嫩條長成。生花頭方澆清水。薰花開若澆糞則不結  
實。梢<sup>吐去</sup>花後未成實若澆糞則蒂盡落而無實。俟實成核而  
澆。遇早晚用雨水河水冷茶潤其根。臘月貯金汁愈久愈佳。二年三  
年鮮熱毒如痘瘡熱極藥不可療者飲下即發時痘熱極者亦然。  
尤宜於樹。有甥以鴨糞澆水澆或灰湯停冷澆或小便澆之。旋用河  
水辭之。凡澆一切花木草卉斷不用井水。壅樹只宜十一月十二月正  
月將積貯肥泥壅高三五寸餘月不宜壅。草河泥以糞酵三四次  
火煨之。搗碎貯之。隔年用之更佳。黃泥浸坑廁中半餘取出晒乾。

杆挿須擇向陽微肥嫩枝條長尺許止露三寸出土周圍肥泥壅之日以  
雨水潤之夏搭棚蔽日候長成移栽。八月十三日至廿二日凡十日為曆  
家天忌種樹

春花之來不宜背陽秋花者居陰亦無害蓋以冬日漸至冬無日暖氣  
不充故春花不替夏日北至陰處皆有陽光至秋而花自不妨也

### 木果品

桃 杏 梅 李 枇杷 棗 梨 栗 柿 楊梅 花紅

橘 橙 柑 牛奶 柚 香櫞 朱欒 銀杏 榛 石櫚 櫻桃

葡萄 蘋果 荔枝 橄欖 木瓜 胡桃 羊婆奶

### 無花果

藏青梅枇杷花紅蓮蓬 十一月臘中用湯泥冷淨磁器貯臘水用銅青末於貼藏時插入水中四果  
浸貯顏色不變



筆桃出福州其花  
五瓣色青黃

桃樹宜密而少一株三年而實五盛七衰十死

十年則死俗呼為短命者

至六年以刀

豎劈其皮令膠皮可多活五年。花接李生子紅而甘李接桃生子

仍為桃。梓接桃則成金桃。桃接杏結實最大。桃樹遇春月以刀疎斫

之則穠出而不結。花子柱者以蔗猪頭汁冷澆之即不結。樹下草宜

鋤。桃種有匾桃、墨桃、鷹嘴桃、半斤桃、五月桃、金桃、銀桃、裏桃、茄桃

鴛鴦桃、千葉桃、紅開最後、花勝人面桃、瑞仙桃、壽星桃、十月桃

又名雪桃古冬桃

桃熟時於牆而煖處寬沃為坎收溼牛糞納坎中將爛桃帶肉者尖

頭向上埋糞內如尖向下則少實

年用橫則所生之實不顯其種九月接皆然

要糞土厚蓋一

尺深至春芽生帶土移植實地長二三尺和土移栽若不移則實少

味安。○移小桃勿動其根上之泥根若離原土栽亦不活。○接桃宜二八月不接結實不佳。○結實多宜莢莢之則太。○一說取核刷淨縫中肉令女子斝粒下種則花斝子盛。○社日春桃樹下則結實牢油地不宜栽桃。○桃樹生小蟲如蟻以多年竹燈葉挂樹間則紛墜下。○結子自乾枝上者名桃裏入藥。○桃杏花本五出而六出者双仁能殺人者失常也。○忌與鰾同食多食損胃發熱。○端午日以麪糝糊入鹽少許候冷入甕收未熟桃滿甕封固冬月可食不可取太熟者但擇色紅者佳。

桃性早花故周南以興女之年時供鬻誘云白頭種桃云桃李以梅子三言桃生三歲便生果其實早於梅李故雖白頭而利可待也

杏樹種勿密宜近人家有損無益小兒尤不宜食。○樹上爛熟者

杏之根葉花  
皆赤。故言若  
蟻。蟻夏聚巢  
杏之大也。

連肉埋如種桃法。長三四尺和土移栽。既移不得再移。○梅接杏曰杏梅。  
不接曰沙杏。○用桃樹接。○杏樹根生最深。以大石壓根。則花盛實繁。  
杏實繁。秋采有收。○以接出者接枝。來年即實。○以婚家鷄鳴酒澆。  
奠處子裙繫樹上。不結者即結。○臘中以酒奠而祝之。○多食傷筋。  
骨。使仁者殺人者。仁久服。目黃眉髮。鬚落。更動宿疾。研細可治犬傷。  
危。李杏宜南北行。○杏結實多。而不結。主來歲秋采有收。

梅春間取根埋奠地。芽長二三尺移栽。○連肉埋種亦得。○梅接桃。  
則實脆。○若移大樹。須去枝梢。大其根盤沃以淋泥。則易活。○兩步。  
種一棵。○春分前接。易活。○野梅名江梅。接桃樹名墨梅。○梅以八。

月為臘八九月墮培用糞和河泥○瓶中折枝以肉汁去浮油熔蠟  
封固可以結實舒葉久、生根至八月栽之、黃酈魚汁亦可○子赤  
者材堅韌子白者材脆○實壞齒及竅○種類甚多 官城消梅綠

華百葉湘梅金剛拳照水梅玉蝶紅梅

梅先春而花其實亦未故標有梅為母嫁之候

李樹種宜稀桃樹接則紅甘樹下宜鋤去草穢不用澆溉肥則不結  
實○元旦四更以火把照樹上下四旁謂之嫁李又以斧斑駁斫不置  
石樹杖中以長竿擊樹梢○青翠李御黃李上品也紫粉小青下  
品也一種參李紅者是參熟可食花實俱小種核如種桃法長尺即  
移栽不移則實少味苦○以杏接之來年即生○桃接則佳○嘉慶子

肉脆而甘、外青內紅。臘月中以杖微打、捥枝間、正月梅後打之。臘月  
取根上起條分栽。連陰則子細而味不佳。李皮水煎含之可治齒  
痛。忌與雞同食、雀同食、食多令人虛熱發瘧、實不沉水者有毒。久  
病人食之病加重、和白蜜食傷人五內。李性耐久、李老而結實不細、處處桃李  
詩云、搜我以桃李報之以李

枇杷寒暑不變色、負雪開花、春間結子、夏間成熟、秋發落、備四時之  
氣。核種即出、待長移栽。三月本已接過、貼嫩枝上則易生、且少核  
多實、再接核小。用淋過淡灰塵、振去著糞即死。臘水同薄  
荷一握、明礬少許入甕中、浸之可久。其核植碎、洗露衣、蒸壞者  
能去跡。忌與羊肉同食、又忌與麪同食、多食發痰熱。

年角鵲心皆素  
名亦各本安

藥山東青州者良取根旁發生者移栽供如小鍾大貼接之結子繁  
太。又法選味好者二月間種之候芽生高移栽三步一棵開花時  
以杖擊樹則結實多。端午日用斧於樹上斑駁敲打則結實肥太  
元旦日未出時以斧斑駁推擊謂之嫁藥。齒痛勿食生藥多食  
動臟腑損脾與蜜同食損五臟瘦弱人勿食血虛脾虛忌食令人  
寒中損黃多痰醫家名之百益紅一名含消。根旁令牛馬履踐令淨  
藥熟本年禾豐。牙藥波斯藥出廣州柳藥水菱藥出安邑天蒸  
藥出江南鹿鞭藥出江東浙江婺州出者曰南藥東海藥五年一實  
梨樹只春分一日揀旺盛枝條作拐樣斫下兩頭以大燒又燒紅鐵器

烙定津脉栽之入地二尺餘日不可。春間下種待長三尺移栽或將根

上氣條分栽或取小棠梨接之條幹如酒鍾大於將發芽時取別樹嫩條

如指大者截七八寸長名曰梨貼將元幹接月餘發芽長大易結實

喜肥陰地則花茂。上巳日無風則多實四月結實用箬包裹防象

鼻蟲損傷。或用身接根接俱妙桑上接梨則晚而甘接梨在春分

前十日。梨花瓣大而舒者佳。宣城出乳梨皮厚肉實廣安州紫梨到口

即化連化出脾梨山西信州出鹿梨山東六府出者曰紅消曰秋白曰

香水曰鶯梨皮薄葉多曰瓶梨惟東昌臨清武城為最洞庭梨有十種蜜梨

臨梨張公梨白梨黃梨消梨番梨鶯梨大柘金花梨太師梨而常

熟地名韓氏出者名韓梨肉如玉價貴別處者削皮色變惟此經日不改色。梨性畏凍能解熱毒消腫及惡瘡。可釀酒以大甕貯之蓋封固半歲後便成酒飲之可醉。病酒人煩渴宜食梨。初霜後採梨於屋下掘溪窖院底無令溼潤收梨置中不須覆蓋便得經夏霜多則不得到夏。梨治心熱生不益人多食寒中。產婦金瘡人食之令瘥困。其性益齒而損脾胃正二月勿食。

栗樹臘月初將種埋土中六尺餘移栽二三月取別樹生子大者枝條接之採實時要批殘其枝明年益茂。二月中櫟樹接十月間常須草果之二月解去。不可用手摩擦。凡樹皆然。栗尤甚也。房當中一



子名栗楔治血疾効。用湖沙入新磁器內藏栗夏初如鮮。脚弱者多食之能起行。栗子生者難化生熟者隔食滯氣惟宜風乾食甚益腎。用員眼貯竹簍中挂起員得栗之溼氣而肉肥潤栗得員疏通而易乾。栗能補腎頓食至飽傷脾。蘇子由詩老去自添腰脚病。山翁服栗舊傳方。客來爲說晨興晚三咽徐收白玉漿。作粉和生地枸杞山藥煑粥甚補下元。同橄欖食甚有佳味。三月上旬桐樹可接。

柿有七絕一壽二多陰三無鳥巢四無蟲五霜葉可愛六嘉實七落葉可作書冬間下種待長移栽肥地接三次則無核。柿子一葉中

置棋櫬

音冥查

三隻隔宿即熟木瓜三隻亦可。將生柿置器中用桑

葉鋪底中置生柿上用桑葉蓋之蓋緊四五日熟。柿不可同酒食易  
醉人且惹心痛。乾柿食之有益柿霜白湯點服治喉痛。

丁香柿名櫬

音影

棗即羊棗亦名牛奶柿。有方柿綠柿銅盆柿。春

分秋分後十日俱可接用桿柿。出常熟東鄉曰海門柿虞山者名方

葉柿。用真酵草河泥壅糞厠相近則甚賤。六七月摘莢或落下

若搗碎柿一升水半升釀一日即成柿漆榨之為油傘之用榨後再加

釀之再榨。

楊梅曰楊梅能消食下酒六月間取糞池中浸過核收會二月鋤地種

之待尺許長次年三月移栽三四年後別樹生子枝條接之後栽山地  
其根多留宿土臘月開溝於根旁高處離四五尺以灰糞壅之不  
宜着水遇雨肥水滲下則結子肥大。桑樹接楊梅則不酸。壅以十  
二月樹癩以甘草釘之。楊州人呼為聖僧尤福銅坑第一聚塢次之  
疝氣忌食與燒酒食之無效。汚衣用硫黃烟熏然後洗則無跡

多食發熱損齒連核食之稍可。臘水同薄荷一握明礬少許入甕  
中浸可久。又用臘水明礬二兩鹽四兩而浸

已浸過  
見效

花紅長大若名奈三月開花結子若八月開花結子者曰林擒一云員  
若為林擒臘月取根上氣條移栽法與梨同摘實後有紐系以鐵

橘柚酸者聚痰  
甜者潤肺勿多  
食

線鉤取之、或用百部末及紗木釘塞之、如生毛蟲、用魚腥水潑上、或埋  
蠶紙於地下即死。二月八月用本色接、不接則不實、梨樹接、臘水同  
薄、奇一握、明礬少許入甕中浸之可久。

橙樹栽種及澆壅同柑橘樹。蜜橙皮厚、香橙皮薄而葉尖、蜜橙為上  
品。大約六年必結、諺云五橙六橘。花可蒸茶、并取露法注朱藥條  
下。橙以接柑。橙皮多食傷肝、與檳榔同食、頭旋惡心。

橘於正月取核撒肥地、待長二三尺、移栽澆忌猪糞、橘種甚多、  
區橘、蜜橘、六瓢頭、麻塘、南衡紅、湘橘、金橘、沙橘、而沙橘上尖下潤  
兒如壺形、葉如掌大、蜜橘皮薄、色黃、枝葉特長、衆葉攢之而上。

種法每株相去八九尺。溝以泄水。須去穴枝中間。宜空洞。透風。每歲鋤地四次。冬月河泥糞壅根。夏月溉以清極糞水。亢陽時澆之。浴湯停冷。四更流甚妙。樹上生苔。能害樹。鐵器刮去之。勿使長盛。有蛀屑。以鐵線作鉤。取蟲。以杉木釘塞之。實畏酒香。採者不得飲酒。橙橘無刺者佳。黃梅內米泔水。或糞清水澆。以死氣浸。溺缸內候浮起。取埋橘樹下。次年必盛。用柿樹接。則無核。即本色接三次。亦無核。移種必春分前。秋分後。易活。移後五六日。清水糞澆一次。若陰天。多隔幾日。不妨。待生新肉。根便活矣。冬間不可移。此樹畏寒。活者尚須柴護。况移動乎。夏天斷不可移。若明歲欲

移今年八九月先開斷四邊根鬚土暫壅至春分方移則易活移  
栽須記南枝樛潏坎以冀河泥傾滿方下樹壅實香櫞柑橘皆然  
○爲蟲所食取蟻窩置樹上則蟲自去○京泉云人皆知接而不知  
灌以無底栲栳之類實肥土套樹本根今年春分灌三年後春  
分割斷移栽次年便生勝於接本○吳中王梅村神於接橘百  
無一失園人群集視效終無能者一日諸園請教王曰汝輩取貼  
同用力同惟束縛不同大都兩枝相合貴在生氣流通脂膏浹洽  
起初一縛切要寬：隨力外來以漸從緊汝輩不論內外前後如  
力緊束則氣不展而脂不精故活有分數耳此可心悟無他奇術

由是而推、凡接樹皆然、京衆云、得氣全在皮裡膜外。○澆勿着根  
及樹皮、冬間稻柴包護、二月中旬解撤。○九月內、搗開四圍、濃糞  
培之。○七月、橙柑摘皆忌澆。

金橘三月將枳棘接之、八月移栽、肥地澆以糞水、勿着根及樹皮。

牛奶柑、夏結子、可採蜜浸、留第三次結子、壅以肥土澆灌之、至明

年三月、黃實纔大、可置素頭。○金莖同出太倉沙頭。○用葉莖藏

四月尚鮮、其法貯菜籃中、埋柑摘於中、密封瓶口。

香櫞種宜臨池、則易實而多摘實、以銀杏套其端、或以蒜更好、更  
以蠟滴其蒂。

朱樂即粗皮香櫞也其花摘之如燒酒法以香一分花二分夾和甑內蒸之滴液磁瓶盛之密封瓶口僅容受滴則香不散再以浸香收盡為度香仍密封蒸凡三次乃佳。橙榴玫瑰野蔷薇皆可如法取露。自橙至朱樂十月中宜稻柴包裹二月方解。

鉢杏俗名白果又名公孫樹以公種而孫始得實也種子蒂向上則結實種在池邊結子多種有雌雄稊糯雄者三稊雌者二稊合種多子春初種於肥地候長成小樹和土移栽以生子樹枝接之春分前後移栽。食多令人發脹有至死者惡飲冷白酒可解生食引痰。

陰毛中生八角子最瘻形如蟲而圓四面生足患者橫爛塗之一宿盡死。



根下須著骨石  
水洗常令潤澤  
則滋茂可愛若  
獨立者生亦不佳

又名鴨脚果有樹極大素不生者逐枝接之則遍樹生

榛叢生葉如麻而潤大四月開花色如白栗花結實作毬毬之  
核即榛也宜食益氣力寬腸胃

石槲名丹若一名天漿一名槲槲一名塗林葉未生時以大竹管對合  
於嫩枝條上朝夕灌水一月便生根半年後便可剪下另栽初時  
用竹幫扶恐風搖動一二月後新根托土便不用扶以大石壓根上  
則多實杆嫩枝於肥陰地無不活。凡杆宜先挿一孔然後杆之不然  
損皮矣。富陽槲結實如碗河陰槲名三十八者中止三十八粒

上盆者以石橋有  
大紅粉紅白三色

榴性喜肥儘澆不忌喜日中澆宜以麻餅浸水日午澆。臘月廿五或  
梅雨中折紅接白即作粉色木樺接花更紅有餅橋臺橋瑪瑙橋  
諸種盆橋不要着地二月三月嫩苗莖去其莖至四月發者方莖夏  
置日中每朝米泔水沉浸其盆以時取出晒之土乾又復浸不可得地  
氣就使根長。性喜熱故畏寒立冬即以稻糠包蘖之二月初解開  
山東有番花橋燕中有千瓣白千瓣粉紅千瓣黃千瓣大紅中心花瓣如  
樓臺。石橋多食損肺及患癰成瘻

櫻桃名含桃一名朱桃又名荆桃又名崖蜜一名麥英色正紅者曰  
朱櫻黃色者曰蠟櫻小者曰櫻珠二三月及梅雨中折樹枝有

廣者依原向背擇土中以糞澆再用河泥壅之即茂種必團聚一處易於照管鳥雀啄食以响鈴擊之以網張四旁防之採實後用和糞澆臘月糞澆肥土壅之。其實遇雨則落。其葉播傳蛇毒再搗汁服。東行根殺寸白蟲。核煎湯可發痧癰。老鵝用葉莖同糞則爛。多食終時風傷筋骨小兒多食作熱。其樹向陽者原移向陽向陰者原移向陰處陰陽易地則不生尤樹皆然而櫻桃尤甚。

葡萄有紫白二種白者名水晶葡萄紫者名馬乳用米泔和黑薑皮澆之茂二月以猪糞河泥壅二三月截取藤枝挿肥地待蔓長引上架根上用糞肉汁或清水糞澆結實後剪蔓繁葉則子得承而

霜肥大冬收藤稻草蓋之勿沾溪、則水凍而元且堆末樹邊避霜雪  
欲其肉實當栽於桑樹之側春間鑽桑樹作竅引藤枝入竅中透出  
至二三年其枝長大塞滿樹竅便可斫去葡萄根令托桑樹以生  
結實得實如桑之內北地皆如此種以元貓犬埋根邊生子肥大  
冬月截藤枝長三尺埋窖於熟糞內候春初發芽挿入蘿蔔內栽  
之埋二尺在土中則生根留三五寸在土外常以糞肉汁澆三日以  
水解之天邑乾旱輕鋤根邊土鬆澆之。然自然漿封貯新甕中埋  
之成酒愈久愈佳

類果生於北地冬花夏子。

荔枝名側生結子時若日午有雨則盡落

橄欖名疎果亦名南威將熟時以竹釘釘之或納鹽於皮下其實盡落

胡桃以尖頭向上外青皮染髭及帛皆黑樹皮可染褐春斫皮中出水  
承取沫頭則髮黑皮浸油可黑髮。出燕齊者大而壳厚味淡內嵌

產荆襄者小而味甘。忌同豆豉鴨野鴨同食多食動風痰脫人唇

油胡桃入火中燒半紅埋灰中經二三日不燒

羊婆奶細葉子狀乳類累而生酸甜可食色青紫藥名羅摩子

辛溫無毒主虛勞食葉功同於子俗名婆子針線包補益虛損極

益房藥 摩羅子西地骨皮五味子補子仁酸棗仁主地各五兩為末每服方寸匕酒下日三服

木蘭葉似長生冬便榮常以冬花其實如小柿甘美一名林蘭一名杜蘭皮似桂而香生零陵山谷及秦山狀如楠樹高數仞

無花果不花而實五月五日探得陰乾治咽喉諸疾

康熙二十五月 日

皇上諭題面試諸臣要溪西鷄齊啼魚一二三四五六七八九十百  
千万丈尺半兩俱要做闌悲詩題

徐健菴先生